— M. Albert Petit signale la capture aux environs de Montereau (Seine-et-Marne) de deux exemplaires ♂ et ♀ de l'*Erebia medusa* F., espèce qu'il n'avait jamais rencontrée dans la région et qu'il a prise dans un bois élevé, calcaire, dont la faune est analogue à celle de Lardy.

— M. J. de Joannis signale la capture faite par M. R. Homberg d'*Argyresthia trifasciata* Stgr [Yponomentidae] non loin de Levens (Alpes-Maritimes), le 18 mai 1910. Cette espèce n'avait encore été signalée que du Valais. Il peut être intéressant de désigner la localité précise de la capture. Elle se trouve sur la route qui va de Levens à St-Martin-Vésubie, en suivant la rive gauche de la Vésubie sur le flanc de la montagne, à environ quatre kilomètres de Levens. L'altitude est près de 500 mètres et près de cet endroit se trouve la petite localité de Magayon. Quatre exemplaires ont été pris.

Communications.

Description d'un *Ochodaeus* et de deux *Orphnus* nouveaux [Col. Scarabaeidae]

par E. Benderitter.

Ochodaeus jatahyensis, n. sp. — Tête et prothorax brun foncé, élytres et dessous brun clair, villosité jaune un peu doré. Massue des antennes jaunâtre. Mandibules sinuées sur les côtés. Tête granuleuse, avec un tubercule frontal. Prothorax entièrement et régulièrement garnis de granulations un peu fortes et médiocrement serrées, un sillon longitudinal médian. Poils de la tête un peu longs surtout sur les côtés; ceux du prothorax plus courts et couchés. Écusson long, ponctué, impressionné dans son milieu. Élytres à suture brune; stries formées de gros points à fond plat; interstries subconvexes, à ponctuation granuleuse, chaque interstrie portant trois lignes de poils courts, réguliers, couchés, un peu plus longs sur les côtés; angle apical denté. Long. 8 mill.

Un exemplaire, ma coll. (Jatahy, Brésil).



Fig. 1. — *Ochodaeus jatahyensis* Benderitter.

Comme taille et couleur ressemble assez à *O. miliaris*.

D'après M. G. Arrow, une espèce très semblable et non décrite, provenant du Paraguay, existe au British Museum.

Orphnus Arrowi, n. sp. — Rouge brun, brillant. Prothorax à ponctuation double, formée de gros points peu profonds à fond plat, mélangés de points très petits. Ponctuation des élytres médiocre, irrégulièrement disposée, effacée en arrière; une strie suturale profonde, ponctuée. Interstrie sutural subconvexe, lisse; entre l'écusson et le calus huméral une côte lisse, peu élevée, visible seulement sur le tiers basal; une dépression en forme de strie près du calus huméral. Dessous du corps et fémurs testacés; tibias et tarses bruns.



Fig. 2. — *Orphnus Arrowi* Benderitter.

♂. Épistome à ponctuation médiocre, peu espacée, portant une corne triangulaire, obliquant en arrière; ponctuation du front fine et serrée. Excavation du prothorax grande, entièrement ponctuée arrondie en arrière et contiguë au rebord basal; élévations latérales triangulaires, simples.

♀. Épistome et front à points assez forts, peu serrés. Corselet avec une petite dépression triangulaire, en avant, ponctuée et limitée par deux bourrelets lisses, peu élevés. — Long. 10 mill.

Deux exemplaires (♂, ♀), ma coll. (Machonaland, Victoria).

J'ai dédié cette espèce à M. G. Arrow qui a bien voulu me donner divers renseignements et examiner les espèces décrites dans ce travail.

Orphnus brunneus, n. sp. — Rouge brun, brillant. Tête entièrement imponctuée, épistome avec une corne triangulaire, presque verticale. Prothorax lisse, ponctué seulement aux angles postérieurs; une profonde excavation, lisse triangulaire, éloignée du bord postérieur du corselet; élévations latérales triangulaires, simples, avec la face externe à ponctuation forte, espacée, s'étendant de la pointe aux angles postérieurs du corselet. Élytres à points irréguliers; cinq stries intrahumérales, les deux premières bien marquées à la partie postérieure, nulles en avant, la troisième et la cinquième bien visibles sur toute leur longueur, la quatrième à peine indiquée. — Long. 8,5 mill.



Fig. 3. — *Orphnus brunneus* Benderitter.

Un ♂, ma coll. (Rehoboth, S. O. Afr. allemand).